

Les complications hémodynamiques

La défaillance circulatoire aiguë est une des principales causes d'admission du patient cancéreux en réanimation.

1. Le choc hypovolémique

Il s'agit d'un état de choc où le volume contenu dans le compartiment intravasculaire n'assure pas une perfusion adéquate. Il peut être résulter de pertes externes de liquides comme lors des hémorragies externes, des vomissements et diarrhées et des états de diurèse osmotique (diabète insipide, hypercalcémie,...) ou de séquestration interne de liquides comme lors des hémorragies internes (digestives, hémothorax, hématome rétropéritonéal,...) ou de la constitution d'un troisième espace (ascite, obstruction intestinale, épanchements pleuraux massifs). Le choc anaphylactique et les chocs sur phéochromocytome sont classés parmi les chocs hypovolémiques.

Les hémorragies des tumeurs de la tête et du cou peuvent être difficiles à contrôler et prendre un décours dramatique en cas de rupture de l'artère carotide. Dans ce dernier cas, situation évidente à diagnostiquer, il conviendra de comprimer manuellement le vaisseau et de transférer immédiatement le patient en salle d'opération pour y ligaturer l'artère carotide responsable de l'hémorragie.

Les agents chimiothérapeutiques sont souvent responsables de réaction d'hypersensibilité dont la plus grave est le choc anaphylactique. Les principaux médicaments concernés sont le paclitaxel, le docétaxel et l'asparaginase, pour lesquels une prémédication à base de corticoïdes et d'antihistaminiques sera systématiquement administrée (1). Plus rarement sont impliqués les dérivés du platine, la bléomycine, l'étoposide, le méthotrexate ... (2).

Le phéochromocytome, tumeur sécrétant des catécholamines et naissant le plus souvent dans la médullosurrénale, peut être responsable de crises hypertensives paroxystiques mais également de choc adrénérique. Dans ce dernier cas, on note une tachycardie importante (> 200/min.). Ce choc est souvent secondaire à un traumatisme : chute, manipulation brutale, anesthésie. Il est suivi d'oscillations très rapides de la pression artérielle (hypotension à hypertension pouvant atteindre 300 mm Hg de systolique). Le traitement reposera sur les β - bloquants avec une dose modérée d'hydrocortisone. L'exérèse de la tumeur pourra être aussi responsable d'un collapsus vasculaire immédiat qu'il conviendra de contrôler avec des expanseurs et des corticoïdes. Enfin, il est possible d'observer des états de dépression myocardique réversible s'apparentant à un choc cardiogénique (3;4)

2. Le choc obstructif

Il résulte d'un obstacle à la circulation entraînant une chute du débit cardiaque. Il peut être dû chez le patient cancéreux à une embolie pulmonaire, à une compression des deux veines caves, à un thrombus dans une cavité cardiaque ou un myxome de l'oreillette, à des épanchements pleuraux massifs bilatéraux, à une ventilation mécanique avec des pressions élevées et surtout à une péricardite constrictive ou à un épanchement péricardique responsable d'un tableau de tamponnade. Cette pathologie a été décrite dans le chapitre consacré aux syndromes obstructifs.

3. Le choc cardiogénique

Il s'agit d'une incapacité de la pompe cardiaque qui, défaillante, ne peut assurer aux organes périphériques un débit sanguin suffisant. Chez le cancéreux, cette condition sera souvent observée au cours du choc septique mais également lors de cardiomyopathies toxiques liées au traitement anticancéreux. Les principaux agents impliqués sont le 5-fluorouracile, le cyclophosphamide et l'ifosfamide, les dérivés du platine (cf. complications cardiaques).

4. Le choc distributif

Il est lié à la libération précoce de médiateurs de l'inflammation entraînant dans un premier temps un état hyperdynamique avec débit cardiaque élevé et résistances systémiques basses. Il peut se compliquer d'un syndrome de défaillance multiviscérale (5). Si la principale cause de ce type de choc est l'infection (sepsis), un tel état hémodynamique peut se rencontrer avec le cancer lui-même ou l'administration thérapeutique de cytokines.

Il existe en effet une grande similitude entre l'inflammation et le cancer invasif qui mettent en jeu les mêmes cytokines et protéases (6). Les patients atteints d'un cancer invasif se trouvent également dans un état hypermétabolique dont la perte de poids est souvent la seule expression clinique et a été mise en rapport avec la réponse inflammatoire systémique (7). Le cancer est donc, tout comme les infections ou d'autres pathologies (traumatismes, brûlures, pancréatite,...) une des causes du SIRS (syndrome de réponse inflammatoire systémique), appelé sepsis lorsqu'il est causé par infection. Le SIRS est l'expression clinique d'une inflammation systémique : fièvre ou hypothermie, tachycardie, hyperventilation, hyperleucocytose ou leucopénie. Il peut donc être très difficile chez le cancéreux de faire le diagnostic différentiel entre SIRS néoplasique et sepsis, seule la mise en évidence d'un foyer infectieux et la culture positive pour un germe permettront d'affirmer la nature infectieuse de l'état inflammatoire.

L'administration de cytokines à visée anticancéreuse, éléments de la cascade inflammatoire pouvant l'activer à leur tour, peut induire un SIRS et un choc distributif avec un syndrome de défaillance multiviscérale (8). L'interleukine-2 est l'exemple le mieux documenté dans ce domaine (9) donnant un syndrome de fuite capillaire avec hypotension, oligurie, œdème pulmonaire... Le tableau hémodynamique est similaire à celui du choc septique avec résistances vasculaires basses, débit cardiaque élevé et augmentation de la consommation d'oxygène.

Une autre situation pouvant donner un état similaire est la greffe de moelle osseuse. De par la toxicité du traitement de conditionnement et la libération de cytokines lors de la GVHD, elle est responsable d'une toxicité endothéliale responsable de fuite capillaire se manifestant par une prise de poids. Le tableau peut dégénérer en syndrome de défaillance multiviscérale de mauvais pronostic (10;11).

Le choc septique est une des principales causes de mort chez le patient cancéreux (12). On a constaté une amélioration des résultats avec le temps avec une baisse significative de la mortalité à l'USI et hospitalière en douze ans de 1997 à 2008 (13). L'admission dans une unité plus habituée à recevoir des patients d'oncohématologie est associée à un meilleur pronostic (13). Il existe peu de littérature spécifique sur le sujet, sauf pour noter la mortalité élevée en cas de neutropénie (14). Celle-ci s'améliore également au cours du temps, avec une meilleure survie dans la deuxième partie de la décennie 1998-2008 (15). Si le choc complique la neutropénie consécutif à la chimiothérapie, le pronostic est moins mauvais que communément attendu avec de 33% à l'USI contre 48 % chez les patients hors chimiothérapie

récente (16). Il faut savoir que la neutropénie ne protège pas contre la survenue d'un SDRA et d'un syndrome de défaillance multiviscérale (17). Les différentes infections responsables d'un sepsis chez le cancéreux sont décrites dans d'autres chapitres (neutropénie fébrile, fongémies ...).

Notons que l'évaluation hémodynamique, si elle permet d'affirmer le tableau hyperdynamique souvent d'ailleurs cliniquement évident, ne permet pas de différencier les causes infectieuse ou non infectieuse. Les arguments issus de l'examen clinique seront donc déterminants pour le choix thérapeutique. En cas de doute, il conviendra de couvrir le patient par une antibiothérapie empirique à large spectre.

5. Considérations techniques

La réanimation du patient choqué est basée sur l'utilisation de cathéters veineux centraux destinés à administrer les liquides et à évaluer l'état hémodynamique. Le cancéreux a souvent déjà en place un cathéter veineux central, relié à une chambre d'implantation permanente. Il a été montré que la mesure de la pression veineuse centrale par ce système était fiable (18). En cas de troubles de coagulation, notamment thrombopénies sévères, les cathéters veineux centraux peuvent être placés sans risque majeur (19;20) sous couverture de transfusions de plaquettes et par un médecin expérimenté. Eventuellement, un audioguidage par Doppler peut s'avérer utile (21).

Références

- (1) Albanell J, Baselga J. Systemic therapy emergencies. *Semin Oncol* 2000 Jun;27(3):347-61.
- (2) O'Brien ME, Souberbielle BE. Allergic reactions to cytotoxic drugs--an update. *Ann Oncol* 1992 Sep;3(8):605-10.
- (3) Quezado ZN, Keiser HR, Parker MM. Reversible myocardial depression after massive catecholamine release from a pheochromocytoma. *Crit Care Med* 1992 Apr;20(4):549-51.
- (4) Elian D, Harpaz D, Sucher E, Kaplinsky E, Motro M, Vered Z. Reversible catecholamine-induced cardiomyopathy presenting as acute pulmonary edema in a patient with pheochromocytoma. *Cardiology* 1993;83(1-2):118-20.
- (5) Members of the American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine Consensus Conference Committee. American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine Consensus Conference: definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis [see comments]. *Crit Care Med* 1992 Jun;20(6):864-74.
- (6) Opdenakker G, Van Damme J. Cytokines and proteases in invasive processes: molecular similarities between inflammation and cancer. *Cytokine* 1992 Jul;4(4):251-8.

- (7) Scott HR, McMillan DC, Watson WS, Milroy R, McArdle CS. Longitudinal study of resting energy expenditure, body cell mass and the inflammatory response in male patients with non-small cell lung cancer. *Lung Cancer* 2001 Jun;32(3):307-12.
- (8) Sculier JP, Bron D, Verboven N, Klastersky J. Multiple organ failure during interleukin-2 administration and LAK cells infusion. *Intensive Care Med* 1988;14(6):666-7.
- (9) Diana D, Sculier JP. Haemodynamic effects induced by intravenous administration of high doses of r-Met Hu IL-2 [ala-125] in patients with advanced cancer. *Intensive Care Med* 1990;16(3):167-70.
- (10) Nurnberger W, Willers R, Burdach S, Gobel U. Risk factors for capillary leakage syndrome after bone marrow transplantation. *Ann Hematol* 1997 May;74(5):221-4.
- (11) Haire WD. Multiple organ dysfunction syndrome in hematopoietic stem cell transplantation. *Crit Care Med* 2002 May;30(5 Suppl):S257-S262.
- (12) Sculier JP, Weerts D, Klastersky J. Causes of death in febrile granulocytopenic cancer patients receiving empiric antibiotic therapy. *Eur J Cancer Clin Oncol* 1984 Jan;20(1):55-60.
- (13) Zuber B, Tran TC, Aegerter P, Grimaldi D, Charpentier J, Guidet B, et al. Impact of case volume on survival of septic shock in patients with malignancies. *Crit Care Med* 2012 Jan;40(1):55-62.
- (14) Malik I, Hussain M, Yousuf H. Clinical characteristics and therapeutic outcome of patients with febrile neutropenia who present in shock: need for better strategies. *J Infect* 2001 Feb;42(2):120-5.
- (15) Legrand M, Max A, Peigne V, Mariotte E, Canet E, Debrumetz A, et al. Survival in neutropenic patients with severe sepsis or septic shock. *Crit Care Med* 2012 Jan;40(1):43-9.
- (16) Vandijck DM, Benoit DD, Depuydt PO, Offner FC, Blot SI, Van Tilborgh AK, et al. Impact of recent intravenous chemotherapy on outcome in severe sepsis and septic shock patients with hematological malignancies. *Intensive Care Med* 2008 May;34(5):847-55.
- (17) Sculier JP. Indications for intensive care in the management of infections in cancer patients. In: Klastersky J, editor. *Infectious complications of cancer*. Kluwer Academic Publishers; 1995. p. 233-44.
- (18) Blot F, Laplanche A. Accuracy of totally implanted ports, tunnelled, single- and multiple-lumen central venous catheters for measurement of central venous pressure. *Intensive Care Med* 2000 Dec;26(12):1837-42.
- (19) Barrera R, Mina B, Huang Y, Groeger JS. Acute complications of central line placement in profoundly thrombocytopenic cancer patients. *Cancer* 1996 Nov 1;78(9):2025-30.

- (20) Mumtaz H, Williams V, Hauer-Jensen M, Rowe M, Henry-Tillman RS, Heaton K, et al. Central venous catheter placement in patients with disorders of hemostasis. *Am J Surg* 2000 Dec;180(6):503-5.
- (21) Gilbert TB, Seneff MG, Becker RB. Facilitation of internal jugular venous cannulation using an audio-guided Doppler ultrasound vascular access device: results from a prospective, dual-center, randomized, crossover clinical study. *Crit Care Med* 1995 Jan;23(1):60-5.